

Observa les imatges i actua.

1.



Què faries?

Què NO faries?


2.



Què faries?

Què NO faries?


3.



Què faries?

Què NO faries?

4.



Què faries?

Què NO faries?

5.



Què faries?

Què NO faries?

FULL DE RESPOSTES:

1. Davant una persona inconscient:

- Es cridarà la seva atenció amb estímuls auditius i tàctils per confirmar o no l'estat d'inconsciència. Es comprovarà si respira. Es farà valoració secundària. Es posarà la persona en PLS.
- No es deixarà mai la persona sola, ni es posarà un coixí sota del seu cap. No se li tirarà aigua ni se li donarà cops a la cara per intentar que es reanimi, no es donarà begudes ensucrades o similars.

2. Davant una hemorràgia a la cama:

- S'estirarà la persona. Es netejarà la ferida. Es farà compressió directa. Es farà compressió indirecta. S'elevant la cama per sobre del nivell del cor.
- No es farà torniquet. No es canviaran les primeres compreses encara que hagin quedat plenes de sang.

3. Davant una persona que s'ennuega amb el menjar:

- S'animarà a que faci tos si es tracta d'una obstrucció parcial. Se li donaran 5 cops interescauls a l'esquena seguits de 5 compressions estomacals, si l'obstrucció és total. Si perd el coneixement, es trucarà al 112 i s'iniciaran maniobres de SVB.
- No es donarà cops si està tossint pel risc de caiguda de l'objecte al fons del tracte respiratori. No s'anirà a trucar al 112, si la persona segueix conscient.

4. Davant d'una fractura de braç:

- S'immobilitzaria el braç i es buscarà que hi hagi pols distal.
- No es manipularà el braç. Si la fractura és oberta, no es posarà l'os a dins.

5. Davant d'una aturada cardiorespiratòria:

- S'aplicarà el PAS. Es faran 30 compressions deprimint 5cm el tòrax, a ritme de 100 compressions per minut, i es seguirà amb 2 insuflacions d'intensitat moderada.
- No es faran les maniobres sobre un terra tou (llit), No es repetiran les 2 insuflacions encara que s'observi que no han estat efectives.